

《兽医临床诊断学》复习题

一、单选题

- 1、基本检查法包括（ ）及物理检查法。
A、视诊 B、触诊 C、叩诊 D、问诊 E、听诊
- 2、下列叙述中属于对既往史调查内容的是（ ）
A、某发病猪场最近流行过猪流感。
B、某猪场最近改用国内某著名专家所研究的配方进行自配饲料饲喂。
C、某发病猪场病死猪表现为膀胱出血的症状。
D、某发病猪场猪舍通风不良，室内温度较高，湿度较大，粪便清扫不彻底。
E、某发病猪场病猪主要表现咳嗽、呼吸困难及食欲下降等症状。
- 3、羊下颌出现肿胀，触诊时皮温偏低、较柔软呈生面团状、指压留痕，最可能的是（ ）
A、皮下水肿 B、脓肿 C、血肿 D、皮下气肿 E、蜂窝织炎
- 4、动物出现以眼睑、腹下、阴囊及四肢下部的肿胀，无热无痛，这种肿胀属于（ ）
A、心性水肿 B、肾性水肿 C、营养性水肿 D、肝性水肿 E、血管-神经性水肿
- 5、哺乳仔猪脐部出现一局限性肿胀，进食后及尖叫时肿胀程度加剧，触诊有波动感、内容物不定，能还纳，则肿胀为（ ）
A、炎性肿胀 B、水肿 C、皮下气肿 D、疝 E、脓肿
- 6、马下颌淋巴结显著肿大，触诊有热痛，同时有波动感，此病变最可能的疾病是（ ）
A、咽炎 B、喉炎 C、马腺疫 D、腮腺炎 E、肺疫
- 7、若犬头颈及躯干部皮肤多处脱毛、有疱疹，落皮屑，伴剧烈瘙痒，无其他全身症状发生，提示的疾病可能是（ ）
A、体虱 B、疥癣 C、荨麻疹 D、脂溢性皮炎 E、湿疹
- 8、犬全身被毛均有脱落，被毛变得稀疏，除鳞屑外没有其他皮损现象，应重点考虑（ ）
A、营养性脱毛 B、疥癣 C、皮肤真菌病 D、脂溢性皮炎 E、湿疹
- 9、犬沿背脊出现大片对称性脱毛，伴有肥胖现象，除鳞屑外没有其他皮损现象，应重点考虑（ ）
A、营养性脱毛 B、疥癣 C、皮肤真菌病 D、脂溢性皮炎 E、内分泌性脱毛
- 10、常引起急性消瘦的猪病是（ ）
A、蛔虫感染 B、肿瘤 C、急性胃肠炎 D、佝偻病 E、缺铁性贫血
- 11、在下列情况下，表现多汗的是（ ）
A、严重呕吐 B、严重腹泻 C、前胃疾病（尤其瓣胃阻塞，即百叶干）

D、拟胆碱药的应用 E、抗胆碱药的应用

12、不会导致动物肥胖的原因是（ ）

A、甲状腺功能减退 B、甲状腺功能亢进 C、肾上腺皮质功能亢进 D、运动不足 E、性腺摘除

13、牛呈现前高后低的站姿站立姿势，提示（ ）

A、酮病 B、创伤性网胃心包炎 C、前肢负重困难 D、前肢骨折 E、风湿

14、典型木马样姿势动物最可能患有（ ）

A、痛风 B、风湿病 C、类风湿 D、破伤风 E、中风

15、下列关于结膜潮红描述错误的是（ ）

A、单侧性发红提示局部血液循环发生障碍，见于外伤、结膜炎、角膜炎等
B、双侧性发红可能是全身性血液循环障碍引起，见于发热性疾病、疼痛性疾病、中毒病等。

C、黏膜小血管充盈明显而呈树枝状，称为树枝状充血，多为血液循环或心功能障碍的结果。

D、结膜潮红指有出血，见于严重呼吸困难。

E、发热性疾病如感冒、猪瘟等可见结膜潮红，眼分泌物增多。

16、对中枢性瘫痪的描述，最正确的是（ ）

A、腱反射亢进，肌肉紧张、但不萎缩 B、腱反射亢进，肌肉紧张、且萎缩
C、腱反射亢进，肌肉松弛、但不萎缩 D、腱反射亢进，肌肉松弛、且萎缩
E、腱反射减退，肌肉松弛、但不萎缩

17、猪在下列（ ）情况下，体温不可能低于 38℃。

A、大失血 B、解热药应用过量 C、频繁下痢 D、内脏破裂
E、中暑

18、下列对热型的描述，最正确的是（ ）

A、日温差变动在 1.0℃以内的持续性发热称为稽留热，典型病例见于典型猪瘟、猪丹毒、大叶性肺炎、流行性感冒等。

B、日温差变动在 1.0℃以上的持续性发热称为稽留热，典型病例见于典型猪瘟、大叶性肺炎、流行性感冒等。

C、日温差变动在 1.0℃以内的持续性发热称为稽留热，典型病例见于典型猪瘟、小叶性肺炎、流行性感冒等。

D、日温差变动在 1.0℃以上，但不恢复至正常的发热称为弛张热，典型病例见于典型猪瘟、大叶性肺炎、流行性感冒等。

E、日温差变动在 1.0℃以上，但不恢复至正常的发热称为弛张热，典型病例见于典型

猪瘟、小叶性肺炎、急性猪丹毒等。

- 19、第一心音明显减弱，见于（ ）
A、房室口狭窄 B、贫血 C、心率过快 D、心肌变性梗死 E、应用强心剂
- 20、下列选项中，属于非器质性心杂音的是（ ）
A、房室口狭窄性杂音 B、心包拍水音 C、动脉口狭窄
D、心脏扩张所产生的相对闭锁不全性杂音 E、房室瓣闭锁不全性杂音
- 21、在（ ）情况下，心搏动会明显减弱
A、心肥大 B、心肌炎初期 C、疼痛性疾病 D、轻度贫血 E、渗出性心包炎
- 22、健康动物心音的特点描述，正确的是（ ）
A、黄牛、乳牛、山羊的心音较为清晰，第一心音明显，第二心音较弱
B、猪的心音较清晰，且两个心音的间隔大致相等。
C、犬的心音模糊不清，且两心音的音调、强度、间隔及持续时间均大致相等
D、马第一心音的音调强，持续时间较短，第二心音弱而不清。
E、水牛的心音比黄牛强而清晰
- 23、动物发生渗出性胸膜炎时，其心音变化表现为（ ）
A、第一心音增强 B、第二心音增强 C、第一、二心音同时减弱
D、第一、二心音同时增强 E、第二心音明显减弱或消失，甚至出现拍水音
- 24、动物发生肺炎初期，其心音变化表现为（ ）
A、第一心音增强 B、第二心音增强 C、第一、二心音同时增强
D、第一、二心音同时减弱 E、第二心音减弱、甚至消失
- 25、两心音同时增强，见于（ ）
A、应用强心剂 B、胸壁肥厚 C、慢性心脏衰弱
D、严重贫血 E、慢性肺泡气肿
- 26、第二心音明显减弱，见于（ ）
A、急性肾炎 B、左心室肥大 C、肺淤血水肿 D、主动脉瓣口狭窄 E、二尖瓣闭锁不全
- 27、患牛呼吸时，表现腹壁的起伏动作明显大于胸壁，见于（ ）
A、瘤胃臌气 B、胸部及肺脏疾病 C、膈肌破裂 D、腹腔积液 E、腹壁外伤及腹壁疝
- 28、突然发生剧烈而痛苦的咳嗽，称为（ ）
A、单咳 B、周期性咳嗽 C、阵发性咳嗽 D、发作性咳嗽（呛咳） E、痉挛性咳嗽
- 29、支气管呼吸音是动物呼吸时，气流通过喉部的声门裂隙产生的漩涡运动以及气流在气管、支气管形成涡流所产生的声音，正常时，哪种动物肺部听不到此声音（ ）

A、犬 B、牛 C、羊 D、马 E、猫

30、动物呼吸时，头颈伸直，鼻孔高度开张，鼻翼上翘，肘突外展，肋骨上举，肛门内陷；甚至张口呼吸，见于（ ）

A、肺气肿 B、肺水肿 C、上呼吸道狭窄 D、细支气管炎 E、细支气管炎痉挛

31、干而短的咳嗽，声音清脆，或咳嗽后没有或仅有少量黏稠的分泌物时，见于（ ）

A、肺水肿 B、肺炎 C、肺脓肿 D、肺坏疽 E、胸膜炎

32、咳嗽发生时声音强大而有力称强咳，最常见于（ ）

A、喉气管炎 B、支气管肺炎 C、纤维素性肺炎 D、肺泡气肿 E、胸膜炎

33、动物发生胸腔积液时，叩诊其胸肺部可闻（ ）

A、浊音 B、半浊音 C、破壶音 D、水平浊音 E、金属音

34、大量无色或粉红色细小泡沫样鼻液，见于（ ）

A、肺水肿 B、肺出血 C、纤维素性肺炎 D、鼻出血 E、支气管肺炎

35、动物鼻液呈污秽不洁，带灰色或暗褐色，有尸臭或恶臭味，则提示的疾病多为（ ）

A、呼吸道卡他性炎症 B、呼吸道化脓性炎症 C、坏疽或异物性肺炎
D、霉菌性肺炎 E、大叶性肺炎

36、健康动物，肺泡呼吸音的强弱顺序是（ ）

A、犬猫>羊>奶牛>黄牛、水牛>马 B、马>黄牛、水牛>奶牛>羊>犬猫
C、犬猫>马>羊>奶牛>黄牛、水牛 D、犬猫>羊>黄牛、水牛>奶牛>马
E、犬猫>羊>马>奶牛>黄牛、水牛

37、听诊检查心音时，（ ）心音与脉搏同时出现。

A、第一 B、第二 C、第三 D、第四 E、缩期前杂音

38、不可能导致动物食欲出现增强的因素，见于（ ）

A、饥饿后 B、甲状腺机能亢进 C、肠道寄生虫 D、各种应激 E、糖尿病

39、健康动物吃胎衣不属于异嗜现象的是（ ）

A、马 B、牛 C、犬 D、猪 E、羊

40、鸡出现啄羽癖，最主要原因是（ ）

A、蛋白质（含硫氨基酸缺乏） B、微量元素缺乏 C、维生素缺乏
D、食盐不足 E、缺乏大容积饲料（米糠、麸皮）

41、犬腹部腹围呈对称性增大并下垂，由后方观察更明显，触诊有波动感，见于（ ）

A、急性胃扩张 B、腹腔积液 C、肠便秘 D、肠臌气 E、腹腔肿瘤

42、不容易导致犬腹部出现对称性膨大的现象是（ ）

A、腹腔积液 B、急性胃扩张 C、肠便秘 D、膀胱高度积尿 E、子宫

蓄脓

43、犬腹部前部膨大，呈犬坐喘气，在左腹前部触及有弹性明显增大的囊状物，最有可能的疾病是（ ）

A、积食性胃扩张 B、积气性胃扩张 C、积液性胃扩张 D、肝脏囊状 E、胆囊胆汁充盈

44、常见动物中，其发生呕吐的难易程度不同，容易发生呕吐的难易顺序为（ ）

A、肉食兽>猪>反刍兽>马 B、马>肉食兽>猪>反刍兽 C、猪>反刍兽>马>肉食兽

D、马>反刍兽>猪>肉食兽 E、肉食兽>马>猪>反刍兽

45、呕吐的发生多与采食有关，无意识障碍、神志清醒，称外周性呕吐，不可能见于（ ）

A、颅脑外伤 B、胃肠炎 C、胰腺炎 D、肠道寄生虫感染 E、肠道阻塞

46、健康牛在采食后休息时常进行反刍活动，一般每个食团在口腔中咀嚼（ ）次左右，然后才吞咽

A、5~10 B、10~20 C、30~50 D、60~80 E、90~100

47、下列对健康动物粪便的描述，不正确的是（ ）

A、马粪呈圆块状，落地后一部分破碎 B、黄牛粪呈叠饼状 C、水牛和奶牛粪呈稠粥状（稠糊状）

D、猪粪呈与马粪相似 E、犬猫粪、杂食兽粪呈圆柱状

48、犬腹痛明显，腹腔触诊检查可在右下腹摸到坚实而又弹性的、弯曲的、移动自如的圆柱形的肠管，最可能是（ ）

A、肠便秘 B、肠绞窄 C、肠扭转 D、肠炎 E、肠套叠

49、当动物前段肠管或胃出血时，粪便最可能呈（ ）

A、红色 B、黄色 C、白色 D、黑色 E、绿色

50、犬后腹部触诊检查，发现一个坚实的团块，最不可能的现象是（ ）

A、膀胱肿瘤 B、肠异物阻塞 C、膀胱较大结石 D、肾脏 E、肠扭转

51、在左侧腹部前下方（第11肋骨附近）听到与瘤胃蠕动不一致的流水音时，应考虑（ ）

A、肠炎 B、真胃变位 C、真胃炎 D、瓣胃炎 E、创伤性网胃炎

52、粪呈淡粘土色（灰白色），最可能的是（ ）

A、大肠炎 B、胃炎 C、回肠炎 D、阻塞性黄疸 E、胃溃疡

53、动物排尿量增加，可见于（ ）

A、急性肾炎 B、尿毒症 C、慢性肾炎 D、脱水 E、心功能不全

54、下列疾病，表现少尿或无尿症状的是（ ）

- A、膀胱炎 B、膀胱结石 C、糖尿病 D、急性肾炎 E、尿道炎

55、尿呈棕黄色或黄绿色，振荡后产生黄色泡沫，或泡沫层与尿液之间呈绿褐色，见于（ ）

- A、血红蛋白尿 B、肌红蛋白尿 C、乳糜尿
D、溶血性黄疸 E、肝实质性黄疸和阻塞性黄疸

56、下列指标中，对肾脏疾病诊断最有价值的是（ ）

- A、血尿 B、蛋白尿 C、尿圆柱 D、尿结晶 E、肾上皮细胞及管型

57、不可能导致红细胞数增多的现象是（ ）

- A、脱水 B、高原适应 C、内分泌腺功能低下 D、肝脏肿瘤 E、肾脏肿瘤

58、血液生化检验时，检查动物肾功能的状况一般应检查（ ）

- A、血浆总蛋白 B、血清胆固醇 C、尿素 D、肌酐 E、尿素氮及肌酐

59、犬皮肤、黏膜黄染，检测哪一项指标的结果降低，就表明是肝细胞性黄疸，而非溶血性和胆汁淤积性黄疸（ ）

- A、总胆红素 B、尿胆原 C、转氨酶 D、血清球蛋白 E、血清白蛋白

60、在下列判断动物脱水的指标中，最准确的是（ ）

- A、皮肤弹性降低 B、血液浓稠 C、红细胞压积容量 D、尿少而黄 E、眼球凹陷

二、简答题

1、反刍动物反刍检查的内容、正常反刍活动？

2、临床上如何判断心功能的好坏？

三、问答题

1、请阐述牛瘤胃检查的方法及内容，健康牛瘤胃的正常状态如何？

2、阐述肺泡呼吸音、病理性支气管呼吸音、干啰音、湿啰音、捻发音的特点及所提示的临床诊断意义？

3、常见呕吐所提示的临床诊断意义

《兽医临床诊断学》复习题参考答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	A	B	D	C	B	A	E	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
E	B	B	D	D	D	E	B	D	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	A	E	A	A	D	B	C	D	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
E	A	D	A	C	A	A	D	C	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	B	B	A	A	C	D	E	D	E
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
B	D	C	D	E	E	C	E	C	C

二、简答题

1、简答反刍动物正常反刍活动？

采食后反刍出现的时间	饲喂后 30min~1h
每次反刍持续的时间	约为 30min~1h（平均为 40~50min）
每一个食团再咀嚼的次数	30~50 次
再咀嚼的力量和速度	有力，连续，反刍活动常因外界环境而暂时中断； 绵羊、山羊和鹿的反刍动作比牛轻快而灵活
一昼夜内反刍的周期性次数	约 4~10 次左右（犊牛 16 次/d）

2、临床上如何判断心功能的好坏？

整体变化	沉郁、无力、多汗、气喘、发绀，静脉怒张与皮下浮肿等
心脏和脉管的变化	心率加快与脉搏增多；心音的强度、性质与脉搏的大小、强弱所发生的变化；心律与脉律不齐；心脏杂音的出现；心叩诊浊音区扩大。
附属症状	循环器官机能障碍引起内脏器官淤血的表现：肺淤血；胃肠淤血（食欲减退、腹泻、便秘、慢性前胃弛缓等消化机能障碍）；肝淤血（肝肿大、黄疸）；肾淤血（尿量改变、蛋白尿）。
特殊检查	心脏功能试验、动脉压、中心静脉压的测定，心电图及心音图的描记，X 线及超声波检查等。

三、问答题

1、请阐述牛瘤胃检查的方法及内容，健康牛瘤胃的正常状态？

（1）瘤胃内容物的数量和性状

视诊	触诊	叩诊	穿刺
----	----	----	----

肋窝微陷， 饱食后平坦	肋窝柔软有弹性；中部生面团样，拳压痕 5-10 秒消失；下部坚实	上部鼓音，中部半浊音- 浊音，下部浊音	少量气体
----------------	-------------------------------------	------------------------	------

(2) 瘤胃运动（蠕动）检查—听诊和触诊

蠕动次数	力量	持续时间	节律性	其他
1-2 次/min	远方雷鸣声”，由弱→强→高峰 →逐渐减弱；左肋窝随蠕动逐渐 隆起、变硬，又逐渐平复、下陷	15-20s/次	有节律性， 出现蠕动 峰值	食后 2h 为最旺盛，食 后 4-6h 后逐渐减弱； 饥饿时次数减少

(3) 瘤胃液检查（穿刺）：健康瘤胃液 pH 值为 6.8-7.4，有大量纤毛虫。

2、阐述肺泡呼吸音、病理性支气管呼吸音、干啰音、湿啰音、捻发音的特点及所提示的临床诊断意义？

(1) 特点

	音性	明显期	其他
肺泡呼吸音	柔和，“夫”声	吸气时明显，呼气时弱	黄牛、水牛、马弱
支气管呼吸音	“赫”声	呼气时明显，吸气时弱	犬、羊、奶牛肺门区可闻
干啰音	笛音、口哨声、飞箭音， 猫鸣音、鸽子声、鼻鼾声	呼气时明显	不稳定，咳嗽后可改变
湿啰音	水泡音、沸水声或含漱音	吸气时，吸气末最明显	较稳定，咳嗽后可改变， 但很快又现
捻发音	手指捻发细碎均匀一致的“劈啪”声	仅吸气时可闻， 吸气末最清楚	很稳定

(2) 提示临床意义

肺泡呼吸音	普遍增强	发热病、贫血、代谢性酸中毒		
	减弱或消失	上呼吸道狭窄；呼吸肌麻痹；胸部疼痛	各型肺炎、肺结核及肺水肿；肺气肿	胸腔积液、胸壁肿胀
支气管呼吸音		大叶性肺炎、严重小叶性肺炎实变期	肺脓肿、肺结核等形成肺空洞	渗出性胸膜炎、胸腔积水等上方
干啰音		支气管疾病—慢性支气管炎		
湿啰音		支气管和肺部疾病（渗出期、液化期）		
捻发音		肺实质病变：细支气管、肺泡炎症充血期和消散期		

3、常见呕吐所提示的临床诊断意义

采食后不久一次呕吐大量的胃内容物		过食引起，见于犬、猫和猪
采食后立即发生持续而频繁的呕吐，呕吐物常混有黏液，表示胃黏膜或呕吐中枢长期遭受刺激		常见于胃、十二指肠、胰腺和中枢神经系统的严重疾病
顽固性呕吐，空腹亦发生，呕吐物为粘液，表现痛苦		见于胃、小肠、胰腺的肿瘤，异物梗阻及幽门痉挛所致的顽固性疾病；中枢神经系统疾病；中毒病（毒物对中枢的刺激）
血性呕吐物	呕吐物混有血液	出血性胃炎、胃溃疡；败血性传染病（猪瘟、犬瘟热、猫泛白细胞减少症）等
胆汁性呕吐物	混有胆汁的呕吐物呈黄绿色、碱性	小肠梗阻

粪性 呕吐物	呕吐物性质和气味与粪便相同，往往 采食后较长时间才发生呕吐	犬大肠阻塞、猪肠嵌闭
异物性 呕吐物	呕吐物中有时混有毛团、塑料等异物	犬、猫、猪异嗜癖
寄生虫性 呕吐物	呕吐物中混肠道寄生虫（蛔虫、绦虫），呕吐缓慢发生，每次采食中或采食后有少数呕吐，动物消瘦外，无其他明显症状	犬、猪胃肠道寄生虫