

一、名词解释

败血症 龋齿 窦道 第二期愈合 关节损伤 灭菌 尿石症 复合麻醉 外科感染
风湿病 延期缝合 骨折 新鲜污染创 疝 中耳炎 张力性气胸 支跛
伦伯特式缝合 蜂窝织炎 溃疡

二、填空

1. 局部麻醉分为 () () () () 四种类型
2. 创伤愈合分为 () () ()
3. 术中机械止血可采用 () () () () 等方法
4. 外科手术常用的打结 () () () 三种结
5. 骨折的特有症状包括 () () () 异常活动、肢体变形、骨摩擦音
6. 创伤分为 () () () () 层
7. 椎管内麻醉分为 () ()
8. 局部浸润麻醉分为 () () () ()
9. 骨折愈合时形成的骨痂分为 () () () 三种
10. 引流包括 () () 两类
11. 风湿病按病理过程分为 () () () 三期
12. 骨折的愈合过程包括 () () () 三期

三、选择题

1. 局部麻醉复合全身麻醉称为 ()
A 合并麻醉 B 强化麻醉 C 配合麻醉
2. 奶牛蹄叶炎是 () 的无菌性炎症
A 蹄真皮小叶 B 蹄角质和真皮小叶 C 蹄角质小叶
3. 无明显化脓感染的创伤愈合过程称为 ()
A 第二期愈合 B 痂皮下愈合 C 第一期愈合
4. 污染严重的新鲜污染创在治疗过程中可采用 ()
A 二次缝合 B 密闭缝合 C 延期缝合
5. 连续水平褥式浆膜肌层内翻缝合称为 () 缝合
A 康乃尔式 B 库兴氏 C 伦伯特式
6. 相邻近的多个毛囊感染，炎症融合形成的外科感染称为 ()
A 疮 B 痈 C 疖
7. 传导麻醉可选用 ()
A 0.5%普鲁卡因 B 2%丁卡因 C 2%利多卡因
8. 蹄叶炎的患畜运步时表现为 ()
A 间歇性跛行 B 紧张步行 C 黏着步行
9. 关节损伤的早期可选用 ()
A 温热疗法 B 刺激疗法 C 冷疗法
10. 创底低于创口时，可采用 () 引流
A 管状 B 主动 C 被动

内翻缝合：

垂直褥式浆膜肌层内翻缝合：伦勃特 (Lembert) 氏缝合

连续水平褥式浆膜肌层内翻缝合：库兴氏 (Cushing) 缝合

连续全层水平褥式内翻缝合：康乃尔 (Connell) 氏缝合

荷包缝合

创底低于创口时，可采用 (A) 引流。

A、主动 B、被动 C、管状

当感染化脓创创口高于创底时，可选用 (A) 引流。

A、主动 B、被动 C、管状

浸润麻醉可选用 (A) 普鲁卡因。

A、0.5% B、2% C、5%

“15”

四、多选

1. 治疗淋巴外渗时，可向排出积液的肿胀部注入 ()
A 95%酒精 B 75%酒精 C 酒精福尔马林液 D 生理盐水

2. 为减轻椎间盘突出物对脊神经的压迫可采取的手术方法 ()

A 髓核去除手术 B 半椎板切除手术 C 全椎板切除手术 D 棘上韧带切除术

3. 麻醉指人为的实现动物的 ()

A 镇痛 B 镇静 C 睡眠 D 肌肉松弛

4. 关节脱位主要发生于

A 腕关节 B 膝关节 C 跗关节 D 腕关节

5. 局部麻醉可用到的药物有 ()

A 芬太尼 B 利多卡因 C 盐酸普鲁卡因 D 丁卡因

6. 胸壁透创导致的气胸可能是 ()

A 张力性气胸 B 出血性气胸 C 化脓性气胸 D 开放性气胸

7. 下列不属于手术刀使用方式的是 (B)

A 指压式 B 半握式 C 卓刀式 D 执笔式

8. 煮沸灭菌时需要注意的是 ()

A 玻璃器械在冷水时放入

B 金属器械在冷水时放入

C 玻璃器械在热水时放入

D 金属器械在热水时放入

9. 全身麻醉过程三期划分主要是 ()

A 诱导期 B 兴奋期 C 复苏期 D 麻醉期

10. 下列哪些药物可用于肉芽创治疗

A 2%水杨酸软膏 B 30%鱼石脂软膏 C 3%双氧水 D 2%氧化锌软膏

一 厌氧性感染

(五) 治疗 (同腐败性感染)

1. 局部疗法:

手术疗法: 开放创口, 切除坏死腐败组织

用氧化剂: 3%过氧化氢溶液、0.5%高锰酸钾溶液、含氯杀菌剂、

中性盐类高渗溶液

2. 全身疗法:

抗菌疗法: 抗生素

对症治疗: A 维生素、复合维生素、补充电解质

10. 10%氧化钠可

一 厌氧性感染

(四) 分类与症状

分类: 厌氧性脓肿、厌氧性坏疽、厌氧性蜂窝织炎、恶性水肿、厌氧性败血症

指鼓室及耳咽管的炎症。

指鼓室及耳咽管的炎症。

六、简答题

临床麻醉有风险, 易导致动物意外死亡。临床动物麻醉, 如何采取综合措施, 尽可能避免麻醉意外发生?

九、龋齿

厌氧性病原菌经过皮肤黏膜破口侵入机体所致的一种急性的特异性的感染。

(一) 定义

部分牙釉质、牙本质和牙骨质的慢性、进行性破坏, 同时伴有牙齿硬组织的缺损, 各种动物均可发病。

副鼻窦是指鼻腔周围头骨内的含气空腔, 包括额窦 (多发于马)、上颌窦 (多发于牛)、蝶腭窦、筛窦等。